

利き手 : 右・左

	初回評価	最終評価
ROM 制限	無・有 ( 肩・肘・手関節・手指 )	無・有 ( 肩・肘・手関節・手指 )
筋力低下	無・有 握力 : 右 kg 左 kg	無・有 握力 : 右 kg 左 kg
上肢機能	STEF : 年代別正常域 ( - - ) 右 点 左 点 疼痛 : 無・有 ( 運動時・安静時 )	STEF : 年代別正常域 ( - - ) 右 点 左 点 疼痛 : 無・有 ( 運動時・安静時 )
手指巧緻性	つまみ動作 ( 可・不可 ) 分離動作 ( 可・不可・拙劣 )	つまみ動作 ( 可・不可 ) 分離動作 ( 可・不可・拙劣 )
神経症状	ADL 上問題 無・有 ( 無動症・振戦・固縮 )	ADL 上問題 無・有 ( 無動症・振戦・固縮 )
精神症状	無・有 ( 抑うつ・痴呆・その他 )	無・有 ( 抑うつ・痴呆・その他 )
ADL	坐位保持 : 困難・可 ( 椅子・車椅子 ) は自立 ( 食事・整容・入浴・更衣・トイレ・ 移乗・移動 歩行/車椅子・書字 )	坐位保持 : 困難・可 ( 椅子・車椅子 ) は自立 ( 食事・整容・入浴・更衣・トイレ・ 移乗・移動 歩行/車椅子・書字 )

訓練経過

## 評価結果

### 上肢 ROM 制限

無 ・ 有 （ 肩 ・ 肘 ・ 手関節 ・ 手指 ）

### 上肢筋力低下

無 ・ 有 握力 右： kg 左： kg

### 上肢機能

STEF 右： 点 左： 点 年代別正常域（ ）

### 手指巧緻動作

つまみ動作 可 ・ 不可 分離動作 可 ・ 不可 ・ 拙劣

### 訓練上・ADL上問題となる神経症状

無動症 ・ 振戦 ・ 固縮

### 精神症状

無 ・ 有 （ 抑うつ状態 ・ 痴呆 ・ その他 ）

### ADL

全自立・全介助

一部自立（ 食事 ・ 更衣 ・ 整容 ・ 移乗 ・ 入浴 ・ トイレ ・ 書字 ） は自立

家事動作（ 可 ・ 一部可 ・ 不可 ・ 不要 ）

## 治療目標

## 治療プログラム

上肢・体幹の ROM 維持・改善

上肢・体幹の筋力維持・改善

上肢機能の維持・改善

手指巧緻性の維持・改善

ADL 訓練

家事動作訓練

精神機能の賦活化

その他

## コメント